

Cannabidiol (CBD), solution à 2,5 % (m/m)

Cette préparation ne contient pas de THC (tétrahydrocannabinol) et n'est pas soumise à la Loi sur les Stupéfiants. Elle peut être utilisée pour traiter l'épilepsie (sur prescription médicale). La prescription pour d'autres indications est seulement possible avec la documentation appropriée du médecin (en particulier avec le motif de la prescription).

Tailles d'emballage/prix

Flacon Aponorm brun (avec compte-gouttes standardisé)

20 g (correspondant à 500 mg CBD) Fr. 80.00 (1 mg CBD ≈ Fr. -.16)
50 g (correspondant à 1250 mg CBD) Fr. 200.00 (1 mg CBD ≈ Fr. -.16)

Coûts du traitement

Dose quotidienne de 10 mg Fr. 1.60
Dose quotidienne de 25 mg Fr. 4.00
Dose quotidienne de 50 mg Fr. 8.00
Dose quotidienne de 100 mg Fr. 16.00

36 gouttes correspondent à env. 1,0 g de solution CBD de 2,5%
720 gouttes correspondent à env. 20,0 g de solution CBD de 2,5%
1800 gouttes correspondent à env. 50,0 g de solution CBD de 2,5%

<u>Table de conversion</u> (nombre de gouttes correspondant à X mg de CBD)	
Remarque: compte-gouttes spécial normalisé	
1 goutte	≈ 0,7 mg de CBD
3-4 gouttes	≈ 2,5 mg de CBD
14 gouttes	≈ 10,0 mg de CBD
28 gouttes	≈ 20,0 mg de CBD
36 gouttes (≈ 1 g de sol.)	≈ 25,0 mg de CBD
Dosage en ml: 1 ml (≈ 1 g ≈ 36 gouttes) ≈ 25 mg CBD	
Densité de la solution à 2,5 % CBD: env. 0,95 g/cm ³ → négligeable dans le cadre du dosage avec une seringue de 1 ml	

Dosage

La posologie est déterminée de façon individuelle par le médecin. L'intervalle thérapeutique est très grand, des doses entre 10 mg à 1000 mg de CBD par jour ont été utilisées au cours d'études. Les doses typiques pour les enfants souffrant d'épilepsie sont de 2 à 5 mg (jusqu'à max. 25 ou 50 mg) de CBD/kg de poids corporel (divisés sur plusieurs prises par jour)*.

*Devinsky O. et al. *Lancet Neurol.* 2016 Mar,15(3):270-8; Hess E. J. et al. *Epilepsia* 2016 Oct, 57(10):1617-1624

Prise

Les gouttes huileuses doivent être prises de préférence avec des aliments gras (par exemple dans un peu d'huile, yaourt, lait ou sur un biscuit au beurre).

Conservation/stockage

Date d'expiration: à partir de la date de fabrication, le médicament se conserve 6 mois à température ambiante. La solution est à base d'une huile neutre (Miglyol 812) et est stabilisée avec l'agent conservateur naturel palmitate d'ascorbyle (0,05 %).

Cannabidiol (CBD), solution à 5,0 % (m/m)

Cette préparation ne contient pas de THC (tétrahydrocannabinol) et n'est pas soumise à la Loi sur les Stupéfiants. Elle peut être utilisée pour traiter l'épilepsie (sur prescription médicale). La prescription pour d'autres indications est uniquement possible avec la documentation appropriée du médecin (en particulier avec le motif de la prescription).

Tailles d'emballage/prix

Flacon Aponorm brun (avec compte-gouttes standardisé)

20 g (correspondant à 1000 mg CBD) Fr. 160.00 (1 mg CBD ≈ Fr. -.16)
50 g (correspondant à 2500 mg CBD) Fr. 380.00 (1 mg CBD ≈ Fr. -.15)

Coûts du traitement

Dose quotidienne de 10 mg Fr. 1.60
Dose quotidienne de 25 mg Fr. 4.00
Dose quotidienne de 50 mg Fr. 8.00
Dose quotidienne de 100 mg Fr. 16.00

36 gouttes correspondent à env. 1,0 g de solution CBD 5,0 %
720 gouttes correspondent à env. 20,0 g de solution CBD 5,0 %
1800 gouttes correspondent à env. 50,0 g de solution CBD 5,0 %

<u>Table de conversion</u> (nombre de gouttes correspondant à X mg de CBD)	
Remarque: compte-gouttes spécial normalisé	
1 goutte	≈ 1,4 mg de CBD
3-4 gouttes	≈ 5,0 mg de CBD
7 gouttes	≈ 10,0 mg de CBD
18 gouttes	≈ 25,0 mg de CBD
36 gouttes (≈ 1 g de sol.)	≈ 50,0 mg de CBD
Dosage en ml: 1 ml (≈ 1 g ≈ 36 gouttes) ≈ 50 mg CBD	
Densité de la solution CBD 5,0 %: env. 0,95 g/cm ³ → négligeable dans le cadre du dosage avec une seringue de 1 ml	

Dosage

La posologie est déterminée de façon individuelle par le médecin. L'intervalle thérapeutique est très grand, des doses entre 10 mg à 1000 mg de CBD par jour ont été utilisées au cours d'études. Les doses typiques pour les enfants souffrant d'épilepsie sont de 2 à 5 mg (jusqu'à max. 25 ou 50 mg) de CBD/kg de poids corporel (divisés sur plusieurs prises par jour)*.

*Devinsky O. et al. *Lancet Neurol.* 2016 Mar,15(3):270-8; Hess E. J. et al. *Epilepsia* 2016 Oct, 57(10):1617-1624

Prise

Les gouttes huileuses doivent être prises de préférence avec des aliments gras (par exemple dans un peu d'huile, yaourt, lait ou sur un biscuit au beurre).

Conservation/stockage

Date d'expiration: à partir de la date de fabrication, le médicament se conserve 6 mois à température ambiante. La solution à base d'une huile neutre (Miglyol 812) est stabilisée avec l'agent conservateur naturel palmitate d'ascorbyle (0,05 %).

Cannabidiol (CBD), solution à 10,0 % (m/m)

Cette préparation ne contient pas de THC (tétrahydrocannabinol) et n'est pas soumise à la Loi sur les Stupéfiants. Elle peut être utilisée pour traiter l'épilepsie (sur prescription médicale). La prescription pour d'autres indications est uniquement possible avec la documentation appropriée du médecin (en particulier avec le motif de la prescription).

Tailles d'emballage/prix

Flacon Aponorm brun (avec compte-gouttes standardisé)

10 g	(correspondant à 1000 mg CBD)	Fr. 160.00	(1 mg CBD ≈ Fr. -.16)
20 g	(correspondant à 2000 mg CBD)	Fr. 320.00	(1 mg CBD ≈ Fr. -.16)
50 g	(correspondant à 5000 mg CBD)	Fr. 720.00	(1 mg CBD ≈ Fr. -.15)

Coûts du traitement

Dose quotidienne de 10 mg	Fr. 1.60
Dose quotidienne de 25 mg	Fr. 4.00
Dose quotidienne de 50 mg	Fr. 8.00
Dose quotidienne de 100 mg	Fr. 16.00

36 gouttes correspondent à env. 1,0 g de solution CBD 10,0 %

720 gouttes correspondent à env. 20,0 g de solution CBD 10,0 %

1800 gouttes correspondent à env. 50,0 g de solution CBD 10,0 %

<u>Table de conversion</u> (nombre gouttes correspondant à X mg de CBD)	
Remarque: compte-gouttes spécial normalisé	
1 goutte	≈ 2,8 mg de CBD
3-4 gouttes	≈ 10,0 mg de CBD
9 gouttes	≈ 25,0 mg de CBD
18 gouttes	≈ 50,0 mg de CBD
36 gouttes (≈ 1 g de solution)	≈ 100,0 mg de CBD
Dosage en ml: 1 ml (≈ 1 g ≈ 36 gouttes) ≈ 100 mg CBD	
Densité de la solution CBD 10,0 %: env. 0,95 g/cm ³ → négligeable dans le cadre du dosage avec une seringue de 1 ml	

Dosage

La posologie est déterminée de façon individuelle par le médecin. L'intervalle thérapeutique est très grand, des doses entre 10 mg à 1000 mg de CBD par jour ont été utilisées au cours d'études. Les doses typiques pour les enfants souffrant d'épilepsie sont de 2 à 5 mg (jusqu'à max. 25 ou 50 mg) de CBD/kg de poids corporel (divisés sur plusieurs prises par jour)*.

*Devinsky O. et al. *Lancet Neurol.* 2016 Mar, 15(3):270-8; Hess E. J. et al. *Epilepsia* 2016 Oct, 57(10):1617-1624

Prise

Les gouttes huileuses doivent être prises de préférence avec des aliments gras (par exemple dans un peu d'huile, yaourt, lait ou sur un biscuit au beurre).

Conservation/stockage

Date d'expiration: à partir de la date de fabrication, le médicament se conserve 6 mois à température ambiante. La solution à base d'une huile neutre (Miglyol 812) est stabilisée avec l'agent conservateur naturel palmitate d'ascorbyle (0,05 %).